

Samppj



PODKRĘĆ KOLOR SWOICH UPRAW

- LEPsze WYBARWIENIE OWOCÓW I WARZYW
- WYŻSZY I LEPsZEJ JAKOŚCI PLON
- DŁUŻSZE UTRZYMANIE DOJRZAŁYCH OWOCÓW NA ROŚLINIE
- LEPsZA TRWAŁOŚĆ SKÓRKI ORAZ DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ PO ZBIORZE
- SZYBKIE UZUPEŁNIENIE DEFICYTÓW SKŁADNIKÓW MINERALNYCH





Samppi



- **Smart Biostym Power** – wyjątkowa kombinacja składników pokarmowych, chelatów, kwasów organicznych oraz cukrów pozwala uzyskać szybki efekt wybarwienia i odżywienia rośliny.

- **Specjalny adiuwant**
długo utrzymuje substancję na liściu.



- **Kwasy organiczne:** bursztynowy, cytrynowy, winowy i jabłkowy oraz **cukry:** glukoza i sacharoza stymulują procesy biologiczne odpowiedzialne za intensywny wzrost i rozwój rośliny.
- Rozpuszczalny w wodzie **fosfor** oraz **wapń** wzmacniają ściany komórkowe i podnoszą zdrowotność rośliny.

SKŁAD:

Azot (N) – 8%, Fosfor (P₂O₅) – 3%, Potas (K₂O) – 3%, Magnez (MgO) – 2%, Wapń (CaO) – 1%, Mangan (Mn) – 0,7%, Bor (B) – 0,1%, Żelazo (Fe) – 0,4%, Molibden (Mo) – 0,1%, Miedź (Cu) – 0,05%, Cynk (Zn) – 0,05%, cukry, kwasy organiczne, adiuwant.

ZASTOSOWANIE:

Gatunek	Dawka	zalecana ilość wody	efekt	liczba aplikacji	czas aplikacji /faza wzrostu
Jabłonie	1 L/ha	400-1000	lepsze wybarwienie owoców	3	5 tygodni, 3 tygodnie i 1 tydzień przed zbiorem
Papryka /Pomidor	0,5-1 L/ha	300-500	lepsze wybarwienie owoców	2-3	3 i/lub 2 tygodnie a następnie 1 tydzień przed zbiorami

PORADY PRAKTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW:

- SAMPPI można mieszać z większością fungicydów i insektycydów oraz z mocznikiem.
- Mieszanina zbiornikowa: do 2/3 zbiornika napełnionego wodą dodajemy odmierzoną dawkę SAMPPI i mieszamy, w następnej kolejności dodajemy fungicydy oraz insektycydy, mieszamy i dopełniamy wodą. Zawsze zaleca się wypróbowanie mieszaniny na małym areale.
- Należy unikać mieszanin z produktami silnie zasadowymi takimi jak: wodorotlenek miedzi, nawozy wapniowe, związki fosforoorganiczne gdyż mogą powodować fitotoksyczność.