

Dystrybutor:

Agrokon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin

CONTIGOL 95 EC

**Adiuwant do łącznego stosowania z cieczą użytkową
środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych.**

DZIAŁANIE PREPARATU

CONTIGOL 95 EC powoduje zwiększenie działania środka owadobójczego lub przedziorkobójczego poprzez zwiększenie przyczepności do powierzchni liści, zapobiega również zmywaniu preparatu przez opady i ułatwia wnikanie do rośliny; ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej zmniejszając znoszenie preparatu na sąsiednie uprawy.

ZASTOSOWANIE

CONTIGOL 95 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania ze środkami owadobójczymi i przedziorkobójczymi.

Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

CONTIGOL 95 EC stosować łącznie ze środkami owadobójczymi i przedziorkobójczymi zgodnie z zaleceniami producenta.

Drzewa ziarnkowe

-przędziorek owocowiec

Opryskiwać w okresie bezlistnym przed ruszeniem wegetacji.

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Śliwa

- misecznik śliwowy, pordzewiacz śliwowy

Zalecane stężenie 2% (2 L środka w 100 L wody).

Opryskiwać w okresie pękania pąków (łuski oddzielone, widoczny jasnozielony pąk).

Zalecana ilość cieczy użytkowej 500-1000 L/ha w zależności od wielkości drzew.

Porzeczki

-wielkopąkowiec porzeczkowy

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Leszczyna

-szpeciele

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Grusza

-miodówka gruszowa

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Jabłoń

-mszyca jabłoniowa

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Świerk

-przędziorek sosnowiec

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Modrzew

-ochojnik świerkowo-modrzewiowy

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Cis pospolity

-misecznik Cisowiec

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Środek owadobójczy stosować w dawkach zalecanych w etykiecie-instrukcji stosowania.

Uwagi:

1. Ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu, dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.

2. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

3. Środek stosować w temperaturze powyżej 0°C, podczas bezwietrznej i bezdeszczowej pogody.

4. Przed zastosowaniem CONTIGOL 95 EC na każdej uprawianej po raz pierwszy roślinie oraz w mieszance z innymi środkami należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy na danym gatunku i odmianie nie występują objawy uszkodzenia roślin.

PRZECIWSKAZANIA

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, jakie obowiązują dla środków, z którymi stosuje się CONTIGOL 95 EC.

Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej, nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

OKRES KARENJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): - nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

Preparat przeznaczony do stosowania wyłącznie w rolnictwie. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić

potrzebną jej ilość. Ciecz użytkową danego środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą-instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu CONTIGOL 95 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości, ciągle dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opakowania po preparacie CONTIGOL 95 EC traktować jako odpady komunalne.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Wodę zużyta do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Zapewnić skuteczną wentylację ogólną i miejscową.

Zabrania się palenia, picia, jedzenia podczas pracy z produktem.

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się preparat CONTIGOL 95 EC.

Ochrona dróg oddechowych: Nie ma potrzeby w warunkach odpowiedniej wentylacji. W warunkach niedostatecznej wentylacji, w sytuacjach awaryjnych, gdy stężenie substancji w powietrzu środowiska pracy nie jest znane, nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych, np. maski z pochłaniaczem typu A lub aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Ochrona oczu: Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednie okulary ochronne, google.

Ochrona skóry rąk: Nie wymaga się specjalnego zabezpieczenia, chociaż w celu zminimalizowania ewentualnego zanieczyszczenia rąk zaleca się stosowanie olejoodpornych rękawic ochronnych.

Ochrona ciała: Stosowanie do narażenia podczas pracy z produktem nosić odpowiednią odzież ochronną, olejoodporną, z długimi rękawami i nogawkami, fartuchy itp. I buty ochronne.

Chronić przed dziećmi.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaz opakowanie lub etykietę. Unikać zanieczyszczenia środowiska. O ile to możliwe wyeliminować lub ograniczyć do minimum wytwarzanie opadów. Nie usuwać odpadu do kanalizacji, nie dopuścić do zanieczyszczenia nim wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Sposób likwidacji odpadów: Całkowicie opróżnić pojemniki. Zanieczyszczone pojemniki traktować jak odpady produktu. Pozostałości produktu przekazać do upoważnionej firmy utylizacyjnej. Opakowania jednorazowego użytku utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami opakowaniowymi.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk	58 682 04 04
Kraków	12 411 99 99
Lublin	81 740 89 83
Łódź	42 657 99 00
Poznań	61 847 69 46
Rzeszów	17 866 44 09
Sosnowiec	32 266 11 45
Tarnów	14 631 54 09
Warszawa	22 619 66 54
Wrocław	71 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Numer partii -