

## **NEXT PRO**

### **Zwalcza szkodliwe owady i roztocza żerujące na roślinach uprawnych**

Preparat w formie koncentratu do rozcieńczania w wodzie. Przeznaczony do zwalczania szkodliwych owadów i roztoczy żerujących na roślinach uprawnych. NEXT PRO stosuje się w formie opryskiwania roślin po uprzednim rozcieńczeniu w wodzie, przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych, polowych lub ręcznych.

### **OPIS DZIAŁANIA:**

Preparat działa na szkodniki interwencyjnie, w sposób fizyczny. Po oprysku preparat tworzy na powierzchni rośliny oraz ciałach szkodników powłokę, uniemożliwiającą poruszanie się szkodników, co powoduje zaprzestanie ich żerowania i w rezultacie śmierć. NEXT PRO jest mieszanką związków silikonowych.

Preparat nie zawiera substancji aktywnych. NEXT PRO nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Rozporządzenia WE Nr 1107/2009.

### **Stosowanie:**

#### **• *Drzewa i krzewy owocowe***

Mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczenie liczebności miodówek i wielkopąkowca porzeczkowego

**Zalecane stężenie:** 0,1% - 0,2% (100 – 200 ml na 100 L wody)

**Zalecana ilość wody:** 500 – 750 L/ha

#### **• *Rośliny ozdobne***

Mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczenie liczebności wciornastków i mączlika szklarniowego

**Zalecane stężenie:** 0,1% - 0,2% (100 – 200 ml na 100 L wody)

**Zalecana ilość wody:** ilość wody dopasować tak, aby zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą

#### **• *Warzywa (ogórek, cebula, kapusta głowiasta, burak ćwikłowy)***

Mszyce, przędziorki, ograniczenie występowania wciornastków

**Zalecane stężenie:** 0,1% - 0,2% (100 – 200 ml na 100 L wody)

**Zalecana ilość wody:** ilość wody dopasować tak, aby zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą

#### **• *Zboża ozime i jare***

Mszyce

**Zalecane stężenie:** 0,1% - 0,2% (100 – 200 ml na 100 L wody)

**Zalecana ilość wody:** 200 L/ha

### **UWAGI:**

NEXT PRO należy stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Zabieg można powtórzyć w razie potrzeby po 5-7 dniach lub później.

Należy bardzo dokładnie pokryć chronione rośliny cieczą roboczą, w szczególności miejsca żerowania szkodników. W przypadku zwalczania przędziorków należy pokryć górną i dolną stronę liści.

Przeciwwskazania:

- W uprawie drzew i krzewów owocowych nie należy stosować preparatu NEXT PRO w okresie kwitnienia i wybarwiania się owoców.

- W uprawie drzew i krzewów owocowych nie należy stosować nawozów wapniowych w odstępie 7 dni przed i po zabiegu preparatem NEXT PRO.
- Nie stosować w uprawie pomidora.
- Nie stosować w uprawie roślin o niebieskim zabarwieniu.
- Nie stosować łącznie z adiuwantami.
- Nie przekraczać zaleceń podanych na etykiecie.

Przed pierwszym użyciem preparatu na danym gatunku lub odmianie roślin uprawnych należy wykonać próbny zabieg na kilku roślinach, aby sprawdzić czy nie występują objawy fitotoksyczności.

Zabieg należy wykonywać w godzinach porannych, wieczornych lub w trakcie pochmurnej pogody. Nie stosować, jeśli w ciągu kilku godzin po zabiegu spodziewane są opady. Zalecana temperatura powietrza w trakcie zabiegu: 15-24 °C.

NEXT PRO można stosować łącznie z chemicznymi środkami ochrony roślin. Przed wykonaniem zabiegu mieszanią, należy sprawdzić fizyczną kompatybilność oraz wykonać próbny zabieg, aby sprawdzić czy nie występują objawy fitotoksyczności.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem.

## **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:**

Odmierzyć potrzebną ilość środka NEXT PRO i wlać bezpośrednio do opryskiwacza wypełnionego wodą. Następnie dokładnie wymieszać. W przypadku łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin, NEXT PRO należy dodawać do zbiornika jako ostatni.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową.

### **KLASYFIKACJA**



### **UWAGA**

### **IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H):

**H315** – Działa drażniąco na skórę.

**H319** – Działa drażniąco na oczy.

**H335** – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Dodatkowe informacje o zagrożeniu: Nie dotyczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P):

Zapobieganie:

**P264** – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

**P280** – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**Reagowanie:**

**P302 + P352** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

**P304 + P340** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

**P305 + P351 + P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P332 + P313** – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P337 + P313** – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**OKRES KARENCJI:**

Nie dotyczy

**OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ:**

Nie dotyczy

Pojemność na opakowaniu

Data produkcji: na opakowaniu

Okres ważności: 3 lata

Importer:

AGROSIMEX Sp. o.o., Goliany 43

05-620 Błędów, tel. 48 66 80 481